



EXAMEN ASISTENȚI 21.05.2024

Varianta 2

1. Problemele pacientului cu tulburări psihice sunt următoarele cu excepția :

- a. alterarea nutriției
- b. potențial de alterare a integrității psihice
- c. pneumonia

2. Amnezia este:

- a. tulburarea de memorie
- b. tulburare cognitivă
- c. tulburarea afectivă

3. Delirium tremens se manifestă prin:

- a. confuzie cu delir acut
- b. febră ridicată
- c. tahicardie, hipertensiune arterială

4. Alcoolismul intră în categoria:

- a. nevrozelor
- b. psihozelor toxice
- c. toxicomaniilor

5. Îngrijirea pacienților depresivi implică:

- a. prevenirea tentativelor de suicid
- b. mobilizarea pasivă și activă a pacienților în vederea prevenirii escalelor
- c. ambele variante sunt corecte

6. Anxietatea – problemă aproape constantă în afecțiunile psihotice poate avea drept cauze:

- a. incapacitatea de adaptare la mediu
- b. dificultatea de exprimare a nevoilor
- c. stresul excesiv

7. Crizele isterice se caracterizează prin:

- a. contractură tonică
- b. contractură clonică
- c. incontinență urinară

8. Melena reprezintă hemoragia internă exteriorizată prin:

- a. scaun acoperit cu sânge roșu
- b. scaun negru lucios ca păcura
- c. prin vărsătură

9. Toracocenteza permite:

- a. evacuarea de lichid din cavitatea peritoneală
- b. aspirarea de lichid pleural în scop diagnostic
- c. administrarea de medicamente în spațiul pleural

10. Pentru masajul cardiac extern pacientul este așezat:

- a. în decubit lateral stâng
- b. în decubit dorsal pe un plan dur
- c. în poziție Trendelenburg

11. Dispneea apărută brusc la un pacient ce a suferit recent o intervenție chirurgicală poate sugera:

- a. embolie pulmonară
- b. infarct miocardic acut
- c. accident vascular cerebral

12. Legat de administrarea antibioticelor injectabile este adevărat că

- a. se pot administra 2 antibiotice în aceeași seringă
- b. administrarea se face întotdeauna în bolus rapid (3-5 min)
- c. pot apărea reacții alergice mergând până la șoc anafilactic

13. Tratatamentul de urgență în cazul unei fracturi de coastă vizează:

- a. imobilizarea cât mai solidă a fracturii
- b. transportul accidentatului în poziție șezând care să îi favorizeze respirația
- c. calmarea durerii

14. La pacientul inconștient se recomandă:
- a. alimentație peros cu pacientul în decubit lateral stâng
  - b. alimentație parenterală prin administrarea de soluții perfuzabile ce conțin principiile alimentare de bază
  - c. ambele variante sunt corecte
15. Conduita de urgență în criza de astm bronșic constă în:
- a. sângerarea 300 ml
  - b. oxigenoterapia
  - c. administrarea medicamentelor bronhodilatatoare și antialergice
16. Poziția în pat a pacientului operat sub rahianestezie pentru apendicită acută este:
- a. decubit dorsal cu capul sprijinit pe 1-2 perne
  - b. decubit dorsal cu capul menținut în poziție fixă fără pernă
  - c. decubit lateral stâng pentru a preveni apariția vărsăturilor
17. Semnele specifice prezenței unui corp străin în căile respiratorii superioare sunt:
- a. pacientul nu poate vorbi, tuși, respira
  - b. pacientul e cuprins de panică
  - c. pacientul duce mâna la gât
18. În stopul respirator respirația artificială gură la gură se face într-un ritm de:
- a. 60-80 respirații pe minut
  - b. 14-16 respirații pe minut
  - c. 20-25 respirații pe minut
19. Caracteristicile durerii din infarctul miocardic acut sunt:
- a. cedează după administrarea de algocalmin intravenos
  - b. cedează după administrarea nitroglicerinei sub lingual
  - c. cedează spontan la repaus
20. Semnele sigure ale unei crize de epilepsie sunt:
- a. pierderea conștienței în mod brusc, cădere
  - b. contracții tonico-clonice
  - c. prezența vărsăturilor spontane

