



EXAMEN ASISTENȚI 26.09.2024  
Varianta 2

1. Boala Alzheimer debutează prin:

- a. Tulburări de memorie
- b. Labilitate afectivă
- c. Incoerență cognitivă

2. Debutul schizofreniei poate fi:

- a. Brusc
- b. Lent, insidios
- c. Ambele variante sunt corecte

3. Eliberarea căilor respiratorii la un pacient cu insuficiență respiratorie acută sau stop respirator se obține prin:

- a. Ridicarea mandibulei
- b. Flexia capului
- c. Hiperextensia capului

4. Starea comatoasă poate avea drept cauze endogene:

- a. Diabetul zaharat
- b. Insuficiența renală acută
- c. Intoxicațiile cu barbiturice
- d. Tulburările circulatorii cerebrale

5. Alterarea conștienței se poate manifesta în stările grave prin:

- a. Agitație sau apatie
- b. Delir, confuzie, comă
- c. Dezorientare temporo-spațială
- d. Euforie

6. În stările grave determinate de HDS, obiectivele imediate de îngrijire au drept scop:

- a. Susținerea respirației, circulației, excreției
- b. Combaterea volemiei
- c. Asigurarea aportului nutritiv pe cale naturală

16. Tabloul clinic al astmului bronic include:

- a. Dispnee expiratorie, tuse, wheezing
- b. Dispnee inspiratorie, tuse, wheezing
- c. Dispnee, junghi toracic, febră

17. Bacteriile:

- a. sunt organisme eucariote
- b. se văd doar cu microscopul
- c. sunt organisme procariote

18. Șocul reprezintă:

- a. starea grava în care se produc tulburări la nivel celular-anoxie și acumularea produselor de catabolism
- b. tulburarea conștienței,
- c. dezechilibru între capacitatea vaselor și masa de sânge circulant

19. Alcoolismul intră în categoria:

- a. nevrozelor
- b. psihozelor toxice
- c. toxicomaniilor

20. Îngrijirea pacienților depresivi implică:

- a. prevenirea tentativelor de suicid
- b. mobilizarea pasivă și activă a pacienților în vederea prevenirii escarelor
- c. ambele variante sunt corecte

21. La pacientul inconștient se recomandă:

- a. alimentația per os cu pacientul în decubit lateral
- b. alimentația parenterală cu soluții perfuzabile
- c. ambele variante sunt corecte

22. Hipertensiunea arterială post operator poate fi determinată de:

- a. durere,
- b. hipoxemie
- c. hipopotasemie

23. Hemoptizia apare în:

- a. TBC pulmonar
- b. Neoplasm pulmonar
- c. Broșită cronică

24. Amnezia este:

- a. O tulburare de memorie
- b. O tulburare cognitivă
- c. O tulburare afectivă

25. Pacienții cu oligofrenie prezintă:

- a. Diminuarea atenției spontane
- b. Exagerarea atenției voluntare
- c. Ambele variante sunt corecte